

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 11.03.2022/12282

KULLANILACAGI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Elma	Avrupa kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	30 ml/100 l su (yumurta, nimf, ergin)	14 gün
	Akdiken akarı (<i>Tetranychus viennensis</i>)	25 ml/100 l su (yumurta, nimf, ergin)	
Turungül*	Pasböcüsü (<i>Phyllocoptura oleivora</i>)	20 ml/100 l su	14 gün
	Turungül kırmızıörümceği (<i>Panonychus citri</i>)	(yumurta, nimf, ergin)	
Kiraz	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 l su (nimf, ergin)	14 gün
	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 l su (nimf, ergin)	
Seftali, Nektarin	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 l su (nimf, ergin)	14 gün

*Turungülde faydalılara zararlı olduğu tespit edilmiştir.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durundayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırmaya işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALIBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır. Elma için ilaç normu bodur çeşitler için 25-50 l/da, yarı bodur çeşitler için 25-100 l/da ve yüksek çeşitler için 25 - 150 l/da dir.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamamın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşatmayınız.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

ACS IGUANA 240 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu 23 Akarisit (Kırmızıörümcek İlaç)

240 g/l Spirodiclofen

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 4 saat insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajın dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ILK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalajı veya etiketini birlikte götürünüz Göz: Etkilenen kişinin gözlerini ovmasını engelleyerek ortam sıcaklığında bol suyla en az 15 dakika durulayınız.
Cilt: Maddenin bulduğu giysileri ve ayakkabıları çıkarınız, cildini durulayınız veya bol soğuk su ve sabunla kişiye dus alınız. Etkilenme ciddi düzeydeyse doktora başvurunuz.

Soluma: Etkilenen kişiyi maruz kalınan bölgeden temiz havaya çıkarın ve yatar pozisyonda tutun. Solunum ve kalp durması gibi ciddi durumlarda, acil tıbbi müdahale alın.
Yutma: Sindirilmesi durumunda, bu ürünün GBF'sini göstererek derhal tıbbi yardım isteyiniz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi

uygulatır. **6** **ULUSAL ZEHİR DANISMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114**

Net Miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İçindekiler: Spirodiclofen

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

- H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H350: Kansere yol açabilir.
H410: Sıcul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H361f: Üremeye zarar verme şüphesi var.

ÖNLEM İFADELERİ

- P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buhannı/spreyni solunmayın.
P273: Çevreye verilmemesinden kaçınınız.
P280: Koruyucu eldiven/yüz koruyucu/koruyucu kıyafet/solunum koruma/koruyucu ayakkabı kullanınız.
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.
P501: İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulandırmaktan kaçınınız.

Şule ÇANAKCI

Ruhsatlandırma Uzmanı

SECTOR TARIM VE KİMYA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükdere Çiçekli 05. Kat, No:111, Nispetiye, Beşiktaş/İSTANBUL
T: 444 1 234 P: +90 212 245 00 93 www.sectortarim.com.tr
SELÇUK V.D.: 7570237729 TİC. SİC. NO: 26457

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Yapılacak bahçe kontrollerinde yaprak başına ortalama 3-5 canlı birey görüldüğünde uygulama yapılır.

Elma- Avrupa Kırmızıörümceği ve Akdiken Akarı: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Turunçgil - Pasböcüsü: Mayıs ayı başından itibaren 7-8 günde bir bahçenin değişik yerlerinden el lupu ile 100 meyvede yapılan sayımlarda, bir görüş alanında (1-2 cm²) 1-2 adet pasböcüsü görüldüğünde ilaçlı mücadele başlanır.

Turunçgil- Kırmızıörümcek: 10 yaprakta yapılacak sayımlarda 9 ve üzeri canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulamalar çiçeklenmeden önce yapılmalı, bu dönem geçirilmiş ise meyve bağlandıktan bir hafta sonra yapılmalıdır.

Kiraz- İki Noktalı Kırmızıörümcek: Uygulamalar meyvesiz ağaçlarda veya hasattan sonra yapılmalıdır.

Bağ- İki Noktalı Kırmızıörümcek: Yaprak başına 5-8 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şeftali, Nektarin - İki Noktalı Kırmızıörümcek: Yapılan sayımlarda, yaprak başına ortalama 3-5 adet üzerinde kırmızıörümcek görülmesi durumunda uygulama yapılır.

ACS IGUANA 240 SC hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: ACS IGUANA 240 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 23 olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek ACS IGUANA 240 SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 23 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

N. Arıcan
Dr. Nesrin ÇAKIR-ARICAN
Daire Başkanı

06 Nisan 2026
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KIRILIM ÜNİTESİ

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

ACS IGUANA 240 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	23	Akarisit (Kırmızıörümcek İlacı)
-------	----	---------------------------------

240 g/l Spirodiclofen

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

MERKEZ OFİS: Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 444 12 83 | Fax: +90 332 345 00 93 | www.sectortarim.com.tr

FABRİKA: Kırımlı OSB. Mah. Zeytin Dalı Bulvarı No:36 Merkez/AKSARAY

Şule ÇANAKCI
Ruhsatlandırma Uzmanı

SECTOR
SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA
T: 444 12 83 | F: +90 332 345 00 93 | www.sectortarim.com.tr
SELÇUK V.B. : 710 037723 TİC. SİC. NO: 264.11