


İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 19.09.2019/11455

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ*	Bağ mildiyözü (<i>Plasmopara viticola</i>)	1. uygulama: 400 ml/100 l su 2. uygulama: 500 ml/100 l su 3. uygulama: 600 ml/100 l su	21 gün
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	1000 ml/100 l su	21 gün
Portakal	Turuncgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	500 ml/100 l su	21 gün
Domates (Tarla)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	600 ml/da	14 gün
Şeftali	Şeftali yaprak kıvrıkcılığı (<i>Taphrina deformans</i>)	1000 ml/100 l su	21 gün
Zeytin	Zeytinlerde halkalı leke (<i>Spilocaea oleaginea</i> = <i>Cyclogonium oleaginum</i>)	1000 ml/100 l su	-
Kayısı	Yaprak delen (çil) (<i>Wilsonomyces carpophylus</i> = <i>Stigmina carpophila</i>)	1. uygulama 1000 ml/100 l su (Dormant dönem), 2. uygulama 600 ml/100 l su (İlkbahar uygulaması), 3. uygulama 600 ml/100 l su (İlkbahar uygulaması)	21 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
12 Mart 2026

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

BORDORAM

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP M:1 Fungisit (Mantar ilacı)

124 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 2 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

BORDORAM yutulduğunda bulantı, kusma, baş ağrısı, mide ağrısı, tahrişe neden olur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Solunum: Solunduğunda tehlikeli ürün olarak sınıflandırılmış olmamakla birlikte zehirlenme belirtileri görülmesi halinde etkilenen kişinin temiz havaya çıkarılması ve yatar pozisyonda tutulması önerilmektedir.

Yutma: Kusturmayınız, kusma durumu olursa o anda nefes almasını önlemek için başı öne doğru eğiniz. Etkilenen kişiyi yatar pozisyonda tutunuz. Ağzını su ile çalkalayınız.

Deri: Cilde temas etmesi durumunda etkilenen bölgenin akan su ve sabunla temizlenmesi önerilmektedir. Ciltte bozulma olması durumunda Güvenlik Bilgi Formu ile doktora başvurunuz.

Göz: Ortam sıcaklığında bol suyla gözleri en az 15 dakika durulayınız. Etkilenen kişinin gözlerini ovuşturmasını engelleyiniz. Kişi kontak lens kullanıyorsa ve lensler göze yapışmış değilse çıkarılmaları gerekir. Her durumda, yıkama işleminden sonra, ürün GBF'si ile birlikte doktora başvurulması gerekir.

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Bordo karışımı, Etan-1,2-diol, Sodyum diisopropyl naphthalene sulphonate

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P261: Buharını/ spreyini solumaktan kaçınınız.

P273: Çevreye verilmemesinden kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız.

P501: İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka bir amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılar için zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır. Bağ için ilaç normu 10l – 150l/da'dır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcısı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ - Bağ Mildiyözü:

1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: Birinci uygulamadan sonra kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Elma - Elma Karalekesi:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),
2. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görüldüğünde),
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşullar hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda ürünün etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Portakal - Turunçgil Meyvelerinde Kahverengi Çürüklük ve Gövde Zamklanması:

Meyve Enfeksiyonlarına Karşı:

1. uygulama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.
2. uygulama: Havalarda yağışlı giderse 1. uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Gövde Enfeksiyonlarına Karşı: Gövde veya kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-1,5 metre yüksekliğe kadar olan kısımlarına iyice uygulanmalıdır.

Domates - Mildiyö:

Hastalığın her yıl görüldüğü ve zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C ve orantılı nemin en az %80 olması halinde başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmeyen alanlarda ise uygulamaya çevrede ya da tarlada hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.

Şeftali - Şeftali Yaprak Kıvrıcılığı:

1. uygulama: Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra,
2. uygulama: İlkbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

Zeytin - Zeytinlerde Halkalı Leke:

Marmara bölgesinde

1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılır.

SEKTÖR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SEKTÖR

BORDORAM

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	M:1	Fungisit (Mantar ilacı)
------	-----	-------------------------

124 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

12 Mart 2023

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.



Ege bölgesinde

1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
 2. uygulama: İlbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
 3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılır.
- *Tüm uygulamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Akdeniz bölgesinde

1. uygulama: Hasattan sonra,
2. uygulama: İlbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılır.

Kayısı-Yaprak Delen (çil):

1. uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra yapılır.
2. uygulama: İlbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce,
3. uygulama: Meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyırılırken yapılır.

BORDORAM hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

BORDORAM adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup M:1** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **BORDORAM**'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup M:1** hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

BORDORAM

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	M:1	Fungisit (Mantar ilacı)
------	-----	-------------------------

124 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı

RUHSAT SAHİBİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:
SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
MERKEZ OFİS: Büyükkayacak OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1
Selçuklu/KONYA
Tel: 444 12 83 | Fax: +90 332 345 00 93 |
www.sectortarim.com.tr
FABRİKA: Kırımlı OSB. Mah. Zeytin Dalı Bulvarı No:36
Merkez/AKSARAY

Şule ÇANAKCI
Ruhsatlandırma Uzmanı



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

12 Mart 2026