

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Elma - Karaleke:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

2. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görüldüğünde)

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Şeftali, Kayısı, Nektarin - Çiçek Monilyası:

1. uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte),

2. uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100),

Armut - Karaleke:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında

2. uygulama: Beyaz rozet döneminde,

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar: Hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.

Bağ - Kurşuni Küf:

1. uygulama: Tanelerin olgunluk başlangıcında,

2. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Bitki Tahammülü: Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, tavsiye edilen kültür bitkileri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

ACS PRODIUS WG hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ACS PRODIUS WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup D1:9** olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ACS PRODIUS WG**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup D1:9 harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

12 Mart 2026

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

ACS PRODIUS WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu	D1:9	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	------	-------------------------

%50 Cyprodinil



DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Kullanıcı, imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı, ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Büyükkayalık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 444 12 83 | Fax: +90 332 345 00 93 | www.sectortarim.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Kırımlı OSB. Mah. Zeytin Dalı Bulvarı No:36 Merkez/AKSARAY

Şule ÇANAKCI
Ruhsatlandırma Uzmanı



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.