

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası:

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Hıyar (Sera)	Kırmızı örümcekler (<i>Tetranychus spp.</i>)	800 ml/ 100 L su
Şeftali	Dut kabuklubiti (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	3000 ml/ 100 L su
Elma	San Jose kabukulu biti (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	2500 ml/100 L su
Armut	Armut psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	1500 ml/ 100 L su

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmaz. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

N. Nesrin ÇAKIRARICAN
Daire Başkanı
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

29 Kasım 2024

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

XANTEN 800

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grup	-	İnsektisit-Akarisit (Böcek- Kırmızı örümcek ilacı)
------	---	---

800 g/L Mineral Yağ

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Solum: Hastayı temiz havaya çıkarınız. Soluma güçlüğü varsa oksijen veriniz. Hemen doktora başvurunuz.

Cilt ile temas: Etkilenen vücut kısımlarını 10-15 dakika bol su ve sabun ile iyice yıkayınız. Eğer tahriş belirtileri varsa ürün etiketi ile doktora başvurunuz.

Göz ile temas: Gözlerinizi bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Lens varsa çıkarınız. Gerekirse doktora başvurunuz.

Yutma: Sindirilmesi durumunda, bu ürünün GBF'sini göstererek tıbbi yardım isteyiniz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İçindekiler: Mineral Yağ, Hint yağı etoksillenmiş oleat

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

ÖNLEM İFADELERİ

P280: Koruyucu eldiven/göz koruyucu/yüz koruyucu kullan

P301+P310: YUTULMASI HALİNDE: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimini arayın.

P331: Kusturmayınız.

P405: Kilit altında saklayınız.

P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uygun bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Anlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü suları bulandırmaktan kaçınınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Bitki gelişmesinde değişikliklere neden olabileceğinden uygulama sırasında komşu ekilişlerine sürüklenmemesi dikkat ediniz.
- Yazlık yağ tatbikatından 2 ay önce ve 2 ay sonrasına kadar olan süre içinde **Folpet** ve **Captan** etkili maddeli BKÜ kullanılmamalıdır.
- Kükürtlü BKÜ'ler ile birlikte veya kükürtlü BKÜ'le tatbikatından 3 hafta sonrasına kadar uygulama yapılamaz.
- Çok düşük sıcaklıkta (4°C'nin altında) ve yüksek sıcaklıkta (32°C'nin üzerinde) uygulama yapılmamalıdır depolanmamalıdır.
- Ağaçlar solgun durumda iken, önce sulama yapılmalı daha sonra uygulama yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Hıyar (Sera) - Kırmızı örümcekler: İlk sayım için çiçeklenme döneminde seraya parsellerin köşegenlerinden çapraz girilir. 3-5 adımda bir bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızıörümcek nimf ve erginlerinin sayımı yapılır. Dekar başına incelenmesi gerekli yaprak sayısı 10 adettir. Yapraklar üzerindeki canlı kırmızı örümcekler büyüteç ile sayılıp kaydedilir. Toplam canlı kırmızı örümcek sayısı sayılan yaprak adedine bölünür. Bir yaprağa düşen canlı kırmızı örümcek sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızı örümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

Şeftali - Dut Kabuklu biti: Yaz mücadelesi olarak uygulamalar yapılır. İlk larva çıkışında birinci ve bu uygulamadan 20 gün sonra ikinci uygulama yapılır.

Elma - San Jose kabuklu biti:

Kış mücadelesi: Meyve ağaçlarının kış uykusunda bulundukları dönemde, gözlerin uyanmasından iki hafta önceye kadar sıcaklığın 5°C'nin üzerinde olduğu ve yağışsız günlerde Ocak-Mart aylarında uygulanır.

Erken ilkbahar mücadelesi: Ağaçlar gözler uyandıktan sonra, pembe tomurcuk dönemine kadar, zararlıların larva döneminde uygulanır.

Yaz mücadelesi: San-Jose kabuklubiti'nde yavrulama başladığı günlerde birinci ilaçlama ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılır. İkinci döl karşı da aynı şekilde ilaçlama yapılmalıdır.

Armut - Armut Psillidi: Kışlayan döl erginlerinin yumurtalarına karşı mart ayından itibaren yapılan kontrollerde 100 sürgünde en az 10 yumurta görüldüğü zaman ilaçlama yapılır. Bölgelere göre değişmekle birlikte mart- nisan aylarında yapılan sürgün kontrollerinde kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15'den fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: XANTEN 800 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup -** olarak sınıflandırılmış bir insektisit - akaristtir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek XANTEN 800'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup - harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

29 Kasım 2024

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

XANTEN 800

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grup	-	Insektisit-Akarisit (Böcek- Kırmızı Örümcek İlacı)
------	---	---

800 g/L Mineral Yağ

**DEPOLAMA DURUMU**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal la açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİM TESİSİ

GÜNER TARIMSAL MÜHENDİSLİK GIDA HAYVANCILIK VE İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.
Bor karma OSB 2 nolu yol 14 cd. No: 1 Bor/NİĞDE

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA
Tel: 444 12 83 Faks: +90 332 345 00 93
www.sectortarim.com.tr