

EC FERTILIZER
BOR (B), MOLİBDEN (Mo), ve ÇİNKO (Zn-Oksit)
SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
PRESTİJ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Suda Çözünür Bor (B)	%5
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,1
Toplam Çinko (Zn)	%5

UYGULAMA ALANI ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

BİTKİ ADI	TOPRAKTAN UYGULAMA
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, vs.)	200 – 400 ML /da Şaşırtma döneminden itibaren 14 gün ara ile 2 uygulama
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, vb.)	200 – 400 ML /da Şaşırtma döneminden itibaren 14 gün ara ile 2 uygulama
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut vb.)	0,5 – 1 L /da Meyve tutum döneminden itibaren 14 gün ara ile 2 uygulama
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı vb.)	0,5 – 1 L /da Meyve tutum döneminden itibaren 14 gün ara ile 2 uygulama
Narenciye ve Zeytin Ağaçları	0,5 – 1 L /da Meyve tutum döneminden itibaren 14 gün ara ile 2 uygulama
Bağlarda (Çilek, Üzüm vb.)	200 – 400 ML /da Erken ilkbahardan itibaren 14 gün ara ile 2 uygulama
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay vb.)	250 – 500 ML /da Bitkilerin 6-8 yapraklı dönemlerinden itibaren 14 gün ara ile 2 uygulama
Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik)	250 – 500 ML /da Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde birer uygulama
Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.)	250 – 500 ML /da İlk damlama sulama döneminden itibaren 14 gün ara ile 2 uygulama
Baklagiller (Fasulye, Nohut, vb.)	200 – 400 ML /da Bitkilerin 4-6 Yapraklı dönemlerinden itibaren 14 gün ara ile 2 uygulama

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlar da çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı + 5 ila + 35 °C derece arasında olmalıdır.**

UYARILAR

*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız. * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



LİSANS NO: 740

TESCİL NO:

PARTİ/SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren üç yıldır

NET AĞIRLIK: YOĞ.: 1,35 / 0,25 L-0,4 L-0,5 L-1 L-2 L-2,5 L-3 L-4 L-5 L-10 -15 L-20 L-25 L-30 L-35 L

ÜRETİCİ FİRMA: SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. Ve TİC. A.Ş.

Büyükkaymak OSB Mahallesi 103. Cad. No: 9/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 444 1 283 Fax: 0 332 345 00 93 www.sectortarim.com.tr info@sectortarim.com.tr

TAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Etkisini Bittirir.

