

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 19.09.2019/11455

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Bağ *	Bağ mildiyözü (<i>Plasmopara viticola</i>)	1. uygulama: 400 ml/100 L su 2. uygulama: 500 ml/100 L su 3. uygulama: 600 ml/100 L su	21 gün
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	1000 ml/100 L su	14 gün
Portakal	Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	500 ml/100 L su	14 gün
Domates (Tarla)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	600 ml/da	14 gün
Şeftali	Şeftali yaprak kıvrıcılığı (<i>Taphrina deformans</i>)	1000 ml/100 L su	14 gün
Zeytin	Zeytinlerde halkalı leke (<i>Spilocaea oleinea</i> = <i>Cyclogonium oleaginum</i>)	1000 ml/100 L su	-
Kayısı	Yaprak delen (çil) (<i>Wilsonomyces carpophylus</i> = <i>Stigmia carpophila</i>)	1. uygulama 1000 ml/100 L su (Dormant dönem), 2. uygulama 600 ml/100 L su (İlkbahar uygulaması), 3. uygulama 600 ml/100 L su (İlkbahar uygulaması)	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmaz. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

17 Mart 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAT. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

BORDORAM

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP

M:1

Fungisit (Mantar ilacı)

124 g/l Metalik bakıra eşdeğer Bordo Bulamacı

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 2 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: BORDORAM yutulduğunda bulantı, kusma, baş ağrısı, mide ağrısı, tahrişe neden olur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Bir zehirlenme sonucundaki belirtiler maruz kalmanın üzerinden zaman geçtikten sonra ortaya çıkabilir, bu nedenle tereddüt edildiği takdirde, kimyasal ürüne doğrudan maruz kalma veya rahatsızlığın devam etmesi durumunda bu ürünün GBF'sini göstermek suretiyle tıbbi yardım talebinde bulununuz.

Soluma: Solunduğunda tehlikeli ürün olarak sınıflandırılmış olmamakla birlikte zehirlenme belirtileri görülmesi halinde etkilenen kişinin temiz havaya çıkarılması ve yatar pozisyonunda tutulması önerilmektedir.

Yutma: Kusturmayınız, kusma durumu olursa o anda nefes almasını önlemek için başı öne doğru eğiniz. Etkilenen kişiyi yatar pozisyonunda tutunuz. Ağzını su ile çalkalayınız.

Deri Teması: Cilde temas etmesi durumunda etkilenen bölgenin akan su ve sabunla temizlenmesi önerilmektedir. Ciltte bozulma olması durumunda Güvenlik Bilgi Formu ile doktora başvurunuz.

Göz Teması: Ortam sıcaklığında bol suyla gözleri en az 15 dakika durulayınız. Etkilenen kişinin gözlerini ovuşturmasını engelleyiniz. Kişi kontak lens kullanıyorsa ve lensler göze yapışmış değilse çıkarılması gerekir. Her durumda, yıkama işleminden sonra, ürün GBF'si ile birlikte doktora başvurulması gerekir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Bordo karışımı

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P261: Buharını/ spreyini solumaktan kaçının.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P501: İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka bir amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılar için zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.



Bahadır Sağlam

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ**Bağ Mildiyözü:**

1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Elma Karalekesi

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

2. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldünce,

4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşullar hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda ürünün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulanmalıdır.

Portakal-Turuncgil Meyvelerinde Kahverengi Çürüklük ve Gövde Zamklanması:

Meyve Enfeksiyonlarına Karşı: 1. uygulama, sonbaharda yağışlar başlamadan önce veya ilk yağmurlardan hemen sonra yapılmalıdır. Havalarda yağışlı giderse 1. uygulamadan 15 gün sonra 2. uygulama yapılmalıdır.

Gövde Enfeksiyonlarına Karşı: Gövde veya kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-1,5 metre yüksekliğe kadar olan kısımlarına iyice uygulanmalıdır.

Domates-Mildiyö: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzeyinde beyaz küllü konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti ve iklim koşullarına bağlı olarak uygulamaya 7-10 gün ara ile devam edilir.

Şeftali Yaprak Kıvrıcılığı:

1. uygulama: Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra,

2. uygulama: İlbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

Zeytinlerde Halkalı Leke:**Ege bölgesinde**

1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2. uygulama: İlbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılır.

Marmara bölgesinde

1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılır.

Akdeniz bölgesinde

1. uygulama: Hasattan sonra,

2. uygulama: İlbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılır.

Tüm uygulamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Kayı-Yaprak Delen (çil):

1. uygulama: Sonbaharda (dormant dönem) yaprak döneminden hemen sonra yapılır.

2. uygulama: İlbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde) yapılır.

3. uygulama: Meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: BORDORAM adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M:1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için BORDORAM'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (M:1 grubu hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: BORDORAM diğer ürünlerle karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

BORDORAM

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP

M:1

Fungisit (Mantar ilacı)

124 g/l Metalik bakıra eşdeğer Bordo Bulamacı

FİRMA BEYANI

Firma bitki koruma ürününün etikette önel... zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1

Selçuklu/KONYA

Tel: +90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93

www.sectortarim.com.tr

ÜRETİM TESİSİ:

CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

AOSB 3. KISIM, Mahallesi 25 Cad. No: 15

Döşemealtı/ANTALYA



Bahadır Sağlam

