

**EC FERTİLİZER**  
**BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ**  
**NOACOPPER**

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**  
Suda Çözünür Bakır (Cu)

**W/W**  
: % 5

**UYGULAMA ALANI ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI**

| BİTKİ ADI                                                                                        | YAPRAKTAN UYGULAMA                                                           | DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak Vs.)           | 150-200 mL/100 L su<br>Çiçeklenmeden itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama | 500-600 mL /da<br>Çiçeklenmeden itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama |
| Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak Vb. )               | 150-200 mL/100 L su<br>Çiçeklenmeden itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama | 500-600 mL /da<br>Çiçeklenmeden itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama |
| Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.)                                                         | 150-200 mL/100 L su<br>Çiçeklenmeden itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama | 500-600 mL /da<br>Çiçeklenmeden itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama |
| S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.)                                        | 150-200 mL/100 L su<br>Çiçeklenmeden itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama | 500-600 mL /da<br>Çiçeklenmeden itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama |
| Narenciye Ve Zeytin Ağaçları                                                                     | 200 mL/100 Lsu<br>Petal yaprak dönemi öncesi                                 | 500-600 mL /da<br>Petal yaprak dönemi öncesi                            |
| Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb..)                                                                      | 100-200 mL/100 L su<br>Gözler uyanmaya başladığında                          | 500-600 mL /da<br>Gözler uyanmaya başladığında                          |
| Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.) | 100-150 mL/da<br>5-6 yapraklı erken dönemde 1-2 uygulama                     | 500 – 600 mL/da<br>5-6 yapraklı erken dönemde 1-2 uygulama              |
| Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik)                                                         | 100-200 mL/da<br>Kardeşlenme döneminde                                       | 500 – 600 mL/da<br>5-6 yapraklı erken dönemde 1-2 uygulama              |
| Baklagiller (Nohut, Fasulye...)                                                                  | 100-200 mL/da<br>4-6 yaprak erken döneminde                                  | 500 – 600 mL/da<br>4-6 yaprak erken döneminde                           |

**FİRMA BEYANI:** İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

**ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ:** Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

**DEPOLAMA ŞARTLARI:** Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı +5/+ 35 °C derece arasında olmalıdır.**

**UYARILAR:**

\*Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. \*Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. \*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. \*Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. \*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. \*Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız ve asla uygun doz oranlarını aşmayınız. \*H318 Ciddi göz hasarına yol açar. \*H400 Sucul ortamda çok toksiktir. \*H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.



**LİSANS NO : 740**

**TESCİL NO:**

**PARTİ/SERİ NO:**

**ÜRETİM TARİHİ :**

**SON KULLANMA TARİHİ :** Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.

**NET AĞIRLIK:** 0,25 L (0,285 kg) – 0,4 L (0,456 kg)– 0,5 L (0,57 kg) – 1 L (1,14 kg) – 2 L (2,28 kg) – 2,5 L (2,85 kg)–3 L (3,42 kg) – 4 L (4,56 kg) – 5 L (5,7 kg) – 10 L (11,4 kg) – 15 L (17,1 kg) – 20 L ( 22,8 kg) – 25 L (28,5 kg) –30 L (34,2 kg) – 35 L (39,9 kg)–40 L (45,6 kg)



**ÜRETİCİ FİRMA:**

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Büyükkayacık OSB Mahallesi 103. Cad. No: 9/1

Selçuklu/KONYA

Telefon: 444 12 83 Faks: 0 332 345 00 93

www.sectortarim.com.tr info@sectortarim.com.tr



**TAAHHÜT**

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

